



بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳.....

شماره : ۵/۳/۴۶۵۶.....

پیوست: .. ندارد.....

## معاونت آموزشی

### جناب آقای دکتر کلیدری

### معاون محترم درمان

با سلام و احترام

بدینوسیله بند ششم مصوبات هفدهمین کمیته علمی آموزشی برخورد با همه گیری COVID-19 DX که از ساعت ۰۷:۳۰ لغایت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۳۰ در تالار حکمت معاونت آموزشی تشکیل گردید، جهت آگاهی و دستور اقدام مقتضی و ابلاغ به حوزه های ذیربط بر حسب صلاحدید ارسال می گردد.

**بند شش:** موضوع افزایش میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در کشور و استان به عنوان یک چالش مطرح و گزارشی از علل زمینه ای آن از قبیل مشاهده مواردی از درمان های سرپایی و بستری غیر استاندارد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید اهم یافته و تازه های علمی قابل توجه پزشکان درمانگر به شرح ذیل، به معاونین محترم درمان و بهداشت دانشگاه ارائه تا در صورت صلاحدید با هماهنگی نظام پزشکی و سایر ارگان های مرتبط، نسبت به اطلاع رسانی به پزشکان و برنامه ریزی برای اجرای آن اقدام نمایند:

- با توجه به عوارض گوارشی، کلیوی و کبدی NSAID ها در بیماران کووید ۱۹، به عنوان تب بر و ضد درد حتی الامکان از داروی استامینوفن استفاده گردد.

- با توجه به عدم تاثیر آنتی بیوتیک در بیماران کووید ۱۹ و بروز عوارض و مقاومت آنتی بیوتیکی، از تجویز آنتی بیوتیک هایی از قبیل آزیترومایسین و یا داکسی سیکلین، بدون وجود اندیکاسیون قطعی، جداً خودداری به عمل آید.

- تجویز همزمان هیدروکسی کلروکین با داروهایی از قبیل آزیترومایسین، اندانسترون، دمپریدون، کوئیتیاپین، لووفلوکساسین، و متادون منجر به افزایش بروز عوارض قلبی و افزایش QT و احتمال ایست قلبی می گردد. لذا از تجویز هم زمان کلروکین با داروهای مورد اشاره فوق در بیماران کووید ۱۹ جداً خودداری به عمل آید.

آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت آموزشی

email:education@mui.ac.ir

website:www.edu.mui.ac.ir

تلفن: ۰۳۱-۳۷۹۲۸۰۰۰\_۳۷۹۲۸۰۰۸

نمابر: ۰۳۱-۳۶۶۸۲۰۰۶

صندوق پستی ۱۴۹

کدپستی: ۸۱۷۴۶-۷۳۴۶۱



بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳.....

شماره : ۵/۳/۴۶۵۶.....

پیوست: .. ندارد.....

## معاونت آموزشی

- تجویز کورتون چه خوراکی و چه تزریقی و همچنین داروهای ضد انعقاد خوراکی در بیماران سرپایی کووید ۱۹ منجر به عوارض گردیده و ممنوع می باشد، لذا لازم است از تجویز آن در بیماران سرپایی جداً خودداری به عمل آید.

- از آنجا که در بسیاری مواقع سیر بیماری با یافته های سی تی اسکن دارای همخوانی می باشد، لذا از انجام سی تی اسکن ریه در بیماران با O2sat بالای ۹۳ و فاقد علائم شدید ریوی و یا جهت تشخیص بیماری کووید ۱۹ جدا خودداری به عمل آید.

  
**دکتر محمدرضا صبری**  
**معاون آموزشی**

آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت آموزشی

تلفن: ۰۳۱-۳۷۹۲۸۰۰۸\_۳۷۹۲۸۰۰۰-۳۱

نمابر: ۰۳۱-۳۶۶۸۲۰۰۶

کدپستی: ۱۴۹ صندوق پستی

۸۱۷۴۶-۷۳۴۶۱

email:education@mui.ac.ir

website:www.edu.mui.ac.ir