



معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

پالو سیکلیب

تابستان ۱۴۰۱

تنظیم و تدوین:

۱. دکتر قاسم جان بایابی
۲. دکتر مهدی شادنوش
۳. دکتر نسرین بیات
۴. دکتر صالح صندوقداران
۵. دکتر فرزانه اشرفی
۶. خانم زهرا سعیدی

با همکاری (به ترتیب حروف الفبا):

۱. دکتر زینب آبیار
۲. دکتر علی باسی
۳. دکتر علیرضا رضوانی
۴. دکتر نازنین رهنما
۵. دکتر رهام سالک
۶. دکتر شراره سیفی
۷. دکتر محمد فرانوش
۸. دکتر مونا ملک زاده
۹. دکتر لیلا مودب شعار
۱۰. دکتر سید اسدالله موسوی
۱۱. دکتر ساناز بخشندہ
۱۲. مرجان مستشار نظامی
۱۳. آزاده حقیقی

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و تدوین راهنمای سلامت

دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعریفه سلامت

دکتر سید موسی طباطبایی لطفی، دکتر ساناز بخشندہ

بسمه تعالیٰ
راهنمای تجویز داروی پالبوسیکلیب

شرایط تجویز	دوز و تواتر صرف دارو	شرط تجویز دارو		افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز دارو	کاربرد دارو	نام دارو	
		کنترالندیکاسیون	اندیکاسیون				
۱- این دارو در بیماران postmenopausal در ترکیب با یکی از داروهای aromatase inhibitor(AI) استفاده می شود.	۱۲۵ میلی گرم روزانه برای ۲۱ روز، در دوره های pre- perimenopausal در ترکیب با female Gn Rh Agonist و AI استفاده می شود.	* وجود حساسیت به دارو در دوره های ۲۸ روزه ^۳	کنترالندیکاسیون * وجود در نارسایی کبدی نیاز به تنظیم دوز دارد. ^۲	۱- در خلط اول درمان بیمار کانسر پستان مناستاتیک تازه تشخیص داده شده هورمون مثبت و HER2 منفی درصورت وجود یکی از موارد زیر کاربرد دارد: - متاستاز احشایی بدون شواهد کریز احشایی(visceral crisis) - وجود متاستازهای استخوانی وسیع و علامت دار - در درمان بیمار کانسر پستان مناستاتیک هورمون مثبت و HER2 منفی درصورت وجود بیماری حساس به هورمون کاربرد دارد. (بیماری حساس به هورمون عبارت است از پیدایش متاستاز یک سال و یا بیشتر بعد از قطع هورمون درمانی ادجوان)	* فوچ تخصص خون و سرطان بالغین * متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی	بسنری سرپایی بسترنی موقت	پالبوسیکلیب Palbociclib
۲- در بیماران female Gn Rh Agonist و AI استفاده می شود.							
۳- به صورت درمان تک دارویی کاربرد ندارد.							
۴- در بیماری که سابقه پیشافت بیماری حین درمان با این دارو را داشته است، تکرار یا ادامه مصرف توصیه نمی شود.							

شرایط تجویز	دوز و تواتر صرف دارو	شرط تجویز دارو		افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز دارو	کاربرد دارو	نام دارو
		کنترالاندیکاسیون	اندیکاسیون			
			<p>۳- در درمان بیمار کانسٹرپستان متابعتاً تیک هورمون مثبت و HER2 منفی در صورت وجود بیماری مقاوم به هورمون همراه با تغییر درمان اندوکرین کاربرد دارد.</p> <p>(بیماری مقاوم به هورمون عبارت است از پیدایش متابستاز در حین هورمون درمانی ادجوانات و یا کمتر از یک سال بعد از قطع هورمون درمانی ادجوانات)</p>			