

اولویت بندی دریافت واکسن انفلوانزا در بیماران مبتلا به کانسر

اولویت اول:

- ۱) کلیه بیماران مبتلا به کانسر یا هر نوع بیماری خونی که اسپلنکتومی شده اند.
- ۲) بیماران مبتلا به لوکمی حاد که کموتراپی آنها خاتمه یافته است. (استثنا: بیماران ALL که در حال دریافت درمان maintenance هستند کاندید واکسیناسیون هستند).
- ۳) بیماران با سابقه پیوند مغز استخوان
- ۴) بیماران با سابقه CLL و لنفوم شامل هوچکین و غیرهوچکین (با یا بدون درمان) تبصره: در صورت دریافت ریتوکسیماب تا ۶ ماه بعد از خاتمه ریتوکسیماب، واکسیناسیون انفلوانزا توصیه نمی شود.
- ۵) بیماران مبتلا به کانسر های Solid که در حال کموتراپی یا رادیوتراپی هستند یا حداکثر یک سال از آخرین درمان آنها گذشته است.

اولویت دوم:

- ۱) بیماران مبتلا به مولتیپل میلوم
- ۲) کلیه بیماران مبتلا به کانسر که یک تا ۵ سال از خاتمه درمان آنها گذشته است.
- ۳) افراد خانواده که در تماس نزدیک با بیماران مبتلا به لوکمی حاد یا پیوند مغز استخوان می باشند.