

شماره : ۱۳۰۷۰۷۶۷۴  
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴  
ساعت : ۹:۲۸  
پیوست : پیاپی



## معاونت درمان

### رؤسای محترم مراکز آموزشی در عانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه رؤسای محترم بیمارستانهای خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها

با سلام و احترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، با توجه به استعلام انجام شده در خصوص استفاده از داروی کاربتوسین به عنوان جایگزین آمیبول اکسی توین در زایستگاه و انانق عمل، به پیوست مکاتبه شماره ۱۴۰۲/۷۱۹۲/۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ معاون محترم غذا و دارو منضم به مکاتبه شماره ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵۴۵ رئیس محترم دانشکده داروسازی و علوم دارویی مبنی بر مصرف داروی فوق الذکر صرفاً جهت پیشگیری از خونریزی پس از زایمان (عدم کاربرد برای القای زایمان) جهت ببره برداری لازم ارسال می‌گردد.

جهت دسترسی مراکز غیر دانشگاهی کلیه مکانیات پیوست در سایت معاونت درمان به آدرس [www.ta.mui.ac.ir](http://www.ta.mui.ac.ir) در لینک امور بیماریها/اداره مسابی/آیین نامه ها و دستورالعملها/سلامت مادران بارگزاری شده است.

دکتر مجتبی کلزاری  
مدیر امور بیماری ها  
و مراکز تشخیصی در عانی

شماره : .....۸۳/۷۱۹۲  
تاریخ : .....۱۴۰۱/۱۵/۲۱  
ساعت : .....۱۷:۴۴  
پیوست : .....ندارد



معاونت غذا و دارو

جناب آقای دکتر حیدری طبایی زواره  
معاون محترم درمان

با سلام و احترام

پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹/۲۰ درخصوص استفاده از داروی کارتوبوسین به عنوان جایگزین آمبول اکسی توسین در زایشگاه و اتاق عمل، به پیوست نامه شماره ۱۵۴۵/۱۲/۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰ رئیس محترم دانشکده داروسازی و علوم دارویی مبنی بر مصرف صرفه جهت پیشگیری از خونریزی پس از زایمان (عدم کاربرد برای القای زایمان) جهت استحضار و دستور بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

دکتر محمود اعتباری  
معاون غذا و دارو

شماره : ۱۹۰۴۴۳۵  
تاریخ : ۱۴۰۱/۹/۲۷  
ساعت : ۱۶:۳۸  
پیوست : ندارد



دانشگاه داروسازی و علوم دارویی

لطفاً  
لشتن

جناب آقای دکتر مصطفوی

رئیس محترم دانشگاه داروسازی و علوم دارویی

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه معاون محترم غذا و دارو به شماره ۱۴۰۱/۹/۲۳ در خصوص استفاده از داروی کاربتوسین بعنوان جایزین اکسی توسین موارد ریر قابل ذکر می باشد:

داروی کاربتوسین در واقع آنالوگ طولانی اثر داروی اکسی توسین می باشد که مورد مصرف تایید شده ی آن تنها بعنوان پیشگیری از Post-partum Hemorrhage بدنبال زایمان طبیعی و یا سزارین می باشد. بنابر این تجویز این دارو بعنوان جایگزین داروی اکسی توسین، با توجه به نیمه عمر بالاتر و سهولت مصرف آن، تنها با این اندیکاسیون، می تواند در نظر گرفته شود. ولی تجویز این دارو در سایر موارد اندیکاسیون های مصرف داروی اکسی توسین همانند Labor induction مورد تایید نمی باشد.

دکتر شادی فرشادی  
مدیر گروه داروسازی بالینی و  
خدمات دارویی

شماره : ۰۲۹/۱۵۴۵/ب  
تاریخ : ۱۴۰۱/۱/۱۵  
ساعت : ۸:۰۰  
پیوست : ندارد



## دانشکده داروسازی و علوم دارویی

جناب آقای دکتر اعتباری  
معاون محترم غذا و دارو

با سلام و احترام

پس از حمد خداوند متعال و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، بازگشت به نامه  
شماره ۱۴۰۱/۹/۲۳ در خصوص استفاده از داروی کارتیوسین به جای اکسی توسین،  
به پیوست پاسخ مدیران محترم گروههای داروسازی وسم شناسی و داروسازی بالینی و خدمات دارویی  
جهت استحضار و هر گونه اقدام حضورتان ارسال می‌گردد.

دکتر سید ابوالفضل مصطفوی  
رئیس کاشکده داروسازی و  
علوم دارویی

شماره : ۱۴۰۱۱۱۱۵  
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵  
ساعت : ۱۱:۲۲  
پیوست : ندارد



دانشکده داروسازی و علوم داروئی

جناب آقای دکتر مصطفوی  
رئیس محترم دانشکده داروسازی و علوم داروئی

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۶۸۲۶/د معاونت محترم غذا و داروی استان در خصوص اعلام نظر در مورد کاربرد کاربتوسین به اطلاع می رسانند که این دارو از آنالوگ های اکسی توسین محسوب می شود و در بعضی کشورها برای کنترل خونریزی پس از زایمان به خصوص پس از سزارین به جای اکسی توسین بکار می رود ولی برای القا زایمان در منابع فارماکولوژی مطرح نیست. لذا کاربرد آن به جای اکسی توسین فقط برای کنترل خونریزی پس از زایمان بلامانع است.

دکتر ولی ا... حاج هاشمی  
مدیر گروه داروسازی و سم شناسی