



معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع: طیف فعالیت مجدد مراکز ناباروری در زمان اپیدمی کووید ۱۹

با سلام و احترام

متعاقب بخشنامه شماره ۴۰۰د / ۵۴۷ مورخ ۹۹/۱/۱۷ در خصوص محدودیت فعالیت مراکز ناباروری در اپیدمی کووید ۱۹، با توجه به اهمیت ارائه خدمات درمان نازائی و توجه به این مطلب که امکان فعالیت مراکز در شرایط اپیدمی از لحاظ حفظ ایمنی و کاهش خطر انتشار بر اساس هر استان، شهرستان، بیمارستان یا مرکز متفاوت است، تا اطلاع ثانوی خدمات قابل انجام (حداکثری) در مراکز ناباروری به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱. بیماران کاندید رادیوتراپی و شیمی درمانی که نیاز به خدمات حفظ باروری دارند و ارائه خدمات به آنها شامل تخمک گیری، انجماد و ذخیره تخمک می بایست بدون اتلاف وقت انجام شود.

۲. خانم های با ذخیره تخمدانی پایین (AMH کمتر از ۱،۷ و فولیکول آنترال کمتر از ۷-۵ عدد)، در صورتی که کاندید روش های کمکی درمان ناباروری (ART) باشند می توانند وارد سیکل شده و پس از انجام عملیات تلقیح داخل سیتوپلاسمی، جنین های حاصله ذخیره شوند.

۳. خانم های ۳۸ ساله و بالاتر در صورت تمایل بیمار می توانند تحت تحریک تخمک گذاری و میکرواینجکشن قرار گیرند و جنین های حاصله فریز شوند.

۴. آندومتريوز های شدید با چسبندگی لگنی (گرید ۳ و ۴) هم می توانند در صورت تمایل وارد سیکل شده و پس از انجام عملیات تلقیح داخل سیتوپلاسمی (میکرو اینجکشن)، جنین های حاصله ذخیره شوند.
بدیهی است:

- اصل لازم در ارائه خدمات فوق آمادگی و دارا بودن امکانات لازم برای ارائه خدمت طبق دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت در مدیریت بیماری کووید ۱۹ می باشد.
- افراد مشمول بندهای فوق در صورت هر گونه ابتلا به ضعف سیستم ایمنی (AIDS)، مصرف کورتیکواستروئید و سوء تغذیه) و یا بیماری مزمن قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی، هیپرتانسیون و دیابت نباید وارد سیکل شوند.
- در مشمولین بند های فوق روش کمک باروری ارجح میکرواینجکشن است (به جای IVF).
- نگهداری جنین و تخمک و اسپرم ها در ایام اپیدمی می بایست در تانک های جدید صورت گیرد.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ۴۰۰/۲۱۵۷

تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

پوست دارد

- اعمال IUI، تحریک تخمک گذاری، انتقال جنین و اعمال جراحی ناباروری مردان و اعمال تشخیصی از قبیل هیستروسالپینگوگرافی و هیستروسونوگرافی همچنان به تعویق افتد.

دکتر قاسم جان بابایی



معاون درمان