



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۷۵۰۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری

جناب آقای دکتر محمدرضا صائینی

مدیر کل محترم دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

موضوع: واکسیناسیون کرونا برای مادران باردار

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه شماره ۳۰۲/۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ در خصوص واکسیناسیون کووید-۱۹ در بارداری، ضمن ارسال مجدد نامه شماره ۳۰۰/۲۳۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴، پاسخ سوالات به شرح ذیل به استحضار می رسد:

- واکسن مناسب در دوره بارداری، سینوفارم است.
- حداقل فاصله دز اول و دوم، ۲۱ روز است.
- در حال حاضر نوبت یادآور به افراد بالای ۱۸ سال توصیه می شود لذا افرادی که حداقل ۶ ماه از نوبت قبل گذشته، توصیه به دریافت نوبت یادآور (سوم یا چهارم) می شوند.
- برای واکسن های کووید-۱۹ حداکثر فاصله تعیین نشده و توصیه عمومی، تزریق واکسن در فواصل تعیین شده در دستورالعمل های کشوری است.
- در صورت گذشت ۵ ماه از دز اول، نیازی به شروع ایمن سازی از ابتدا نمی باشد.
- در حال حاضر اجباری شدن واکسیناسیون کووید-۱۹ در هیچ یک از گروه های جمعیتی جزو سیاست های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا نمی باشد و صرفا با آموزش و اطلاع رسانی نسبت به ترغیب آحاد جامعه به واکسیناسیون اقدام می شود.

دکتر محمد مهدی گویا
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر