

## بسمه تعالی

امام حسین گلیایگان

۱. مشابه ۴

۲. **صدمات زنان باردار در تصادفات یا هر ترومایی**

۳. **اگر مادر باردار به علت تصادف آمده** باشد main condition علتی است که حادثه را بوده مثلا accident یا falling و در عین حال برای نشان دادن بارداری از state pregnant استفاده کرد. اما اگر این آسیب منجر به خدمات مامایی شده باید با واژه pregnancy به دنبال مشکل ایجاد شده مثلا خونریزی بود.

۴. در مورد **گزش حشرات به غیر** از کد اصلی گزش حشره علت خارجی و کد زخم محل گزش را باید کد داد؟

Bit و نوع حشره به عنوان تشخیص قلمداد می شود. اگر غیرسمی باشد superficial injury و علت خارجی bit insect nonvenomous اما اگر سمی باشد poisoning می گیرد و علت خارجی contact scorpion.

۵. کد تشخیص LOC:

Semicoma R40.1

۶. کد تشخیص AKI:

تنها اختصار استاندارد برای AKI صدمه حاد کلیه (acute kidney injury) است که البته باید به پزشک برای اطمینان مراجعه کرد و کد N17.9 می گیرد.

۷. **مسمومیت با گاز کلر** و استنشاق هر نوع گاز:

انتخاب Chlorine,gas-fuemes و نوع گاز که کد T54.9 را می گیرد و کدهای تظاهرات و علت خارجی هم نیاز است.

۸. عبور **چرخ ماشین** از روی پا و کد تشخیص و علت خارجی چیست؟

در جدول تصادفات pedestrian و car را چک کرده و V03 و رقم چهارم بسته به ترافیکی و غیرترافیکی بودن

۹. تشخیص پنومونی بعد از اینفکشن و ابرال مخصوصات بعد از بیمای کووید؟

اگر کرونا درمان شده پس یک sequel است و باید **پنومونی جدا و سپس سکوال آن:**

B94.6

۱۰. گواهی فوت نوزاد قسمت مربوط به بیماری های مادر آیا p کد می گیرد یا o کد؟

اشکالات این گواهی: روی اولین خط وضعیت مجاز به گزارش اسفیکسیا نیستیم (مطابق قانون P1 علت اصلی نیست) ۲۵ و ۲۶ خوانا نیست. سندرم دیسترس تنفسی و زجر تنفسی نباید گزارش مادری باشد. همیشه وضعیت مادری از P2-P4 باید استخراج شود.

نور و علی اصغر

۱. کد اقدام OMENTAL PATCH:

تشخیص چیست یا peptic perforation ulcer؟ بسته به توضیحات شرح عمل و پرونده ممکن است نیاز به کدهای بیشتری باشد(فتق شکم یا دیافراگم-زخمهای گوارشی- عفونت های شدید جدار شکم- نقص های مادرزادی).

Graft omentum 54.74

۲. کد اقدام تعبیه کاتتر دیالیز صفاقی:

۳. کد تشخیص **major conjunctive disorder**:  
در صورت عدم احراز تشخیص و علامت بودن **R41.8** بنابراین وابسته به شرایط پرونده است.
۴. نحوه اختصاص کاراکتر چهارم به تشخیص **glomerulonephritis**:  
بر اساس تغییرات مورفولوژیکی کاراکتر چهارم تعیین می شود و با اتوپسی و بیوپسی از کلیه زیررده های ۰ تا ۸ می توان استفاده کرد و اگر گزارش اختصاصی تری نبود از زیررده ۹.
۵. کدهای رده **F10-19** و نحوه اختصاص کاراکتر چهارم:

## .0 Acute intoxication

مشکلات شناختی، ادراکی و خلق و خوی حاد مثل توهم، تشنج و کما

Acute drunkenness (in alcoholism)

"Bad trips" (drugs)

Drunkenness NOS

Pathological intoxication

Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication

## .1 Harmful use

استفاده آسیب زا و مضر (سوء مصرف دارو). هرگاه ماده روان گردان یا دارویی استفاده شود و منجر به آسیب فیزیکی مثل هپاتیت ناشی از مصرف خودسرانه یا مصرف دارو شده یا منجر به آسیب روانی مثل افسردگی به علت مصرف سنگین الکل. این حالت وابستگی به دارو یا موارد را نشان نمی دهد اما گزارش حداقل یک مورد علامت شدید مرتبط با موارد وجود دارد.

Psychoactive substance abuse

## .2 Dependence syndrome

وابستگی مزمن و ناتوانی در پرهیز از مصرف. وابستگی بیش از ۱۲ ماه که اگر درمان نشود ادامه خواهد یافت. در واقع هرگاه سوء مصرف طولانی شود تبدیل به وابستگی می شود. چه جسمی: تعریق، درد عضلانی، سردرد /چه روانی: افسردگی یا اضطراب

Chronic alcoholism

Dipsomania

Drug addiction

## .3 Withdrawal state

تغییر رفتاری ناسازگارانه توام با علائم فیزیولوژیکی شناختی که به علت کاهش موارد به وجود می آید. علائمی مثل سردرد که حاد نیست و طی زمان رخ می دهد.

## .4 Withdrawal state with delirium

Delirium tremens (alcohol-induced)

## .5 Psychotic disorder

وضعیتی که نه حاد است نه به علت قطع داروست و با علائم توهم شنوایی، حسی، ادراکی، هذیان، بدگمانی و وخیم شدن اوضاع روانی بروز می کند. مثل توهم الکلی و سایکوز

Alcoholic:

hallucinosis

jealousy

paranoia

psychosis NOS

### .6 Amnesic syndrome

نقص مزمّن در حافظه بلندمدت و کوتاه مدت. معمولاً باید یک کد اضافه می‌خواهد برای اختلال نورولوژیکی یا غدد درون ریز مثل دمانس الکلی که یک تغییر شناختی خلقی و اختلال شخصیت است

### .7 Residual and late-onset psychotic disorder

Alcoholic dementia NOS

Chronic alcoholic brain syndrome

Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions

Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder

### .8 Other mental and behavioural disorders

### .9 Unspecified mental and behavioural disorder

۶. کد مسمومیت با داروهای ملاتونین، مونته لوکاست و سیلدنافیل:  
ملاتونین یک داروی hypnotic است پس در جدول داروها کد T42.6 را می‌گیرد و یک کد علت خارجی.  
مونته لوکاست برای رینیت و آسم بیشتر کاربرد دارد اگر ضدالتهاب T93.3 اگر ضدآلرژی T45.0 اگر ضدآسم T48.6  
سیلدنافیل\_ sildnafil یا viagra کمک به بهبود اختلال نعوظ است و برای بهبود توانایی ورزش در بزرگسالان مبتلا به فشار خون شریانی ریوی نیز کاربرد دارد.

Tadalafil :ciadlis T46.7

Vardenafil: levitran

Avandafil:stendra

Peripheral vasodilator

۷. کدهای رده E10-11 و نحوه اختصاص کاراکتر چهارم:

فهرست شماره ای

۸. کد مربوط به عوارض اقدامات پزشکی

عیسی بن مریم

۱. نوزادی که به ناچار به خاطر مشکل مادر بستری می‌شود؟

Healthy infant accompanying sick mother Z76.2

۲. خانم بارداری که بارداریش را تحت تاثیر قرار نداده بستری شده.

دلیل مراجعه به همراه pregnant state

۳. کد تشخیص IUI.

اگر منظور قرار دادن اسپرم به طور مستقیم در رحم مادر است یا **intra uterine insemination** که به منظور افزایش شانس بارداریست و نسبت به IVF کمتر تهاجمی می باشد

۴. در پرونده های موقت با تشخیص مولتیپل تروما:

ناچارا **Multiple trauma T07**

۵. در پرونده های ترومایی که بطور روتین چست سی تی و چست برین انجام می شود آیا به عنوان تشخیص به اعضا کد دهیم؟

اگر اسیبی در این اعضا رخ داده بله

۶. بیمارانی که بصورت مداوم برای دریافت تزریق دارو به بیمارستان مراجعه کرده چه کد تشخیصی می گیرند؟

قاعدتا تشخیص در مراجعات مکرر یکسان است و همان باید کدگذاری شود.

۷. به بیماری که قبل از تکمیل روند درمان فرار می کند چه کدی باید داد؟

فقط سوابقی که در بیماری فعلی یا درمان وی اثر داشته کد می گیرد.

۸. در بیمارانی که با مشکل داخلی که سابقه بیماری زمینه ای زیادی دارند آیا به سوابق کد دهیم.

توضیح سوابق

۹. در بیماران سرطانی که بیماری شان فعال است و در حال حاضر به علت مشکلی دیگر مثلا شکستگی بر اثر تروما آمده آیا به سرطان

کد می دهیم؟

به عنوان سایر موارد بله چون به لحاظ درمان و تداخلات دارویی در مراقبت فعالی اثرگذار است.

منظریه

۱. کد مرگ مغزی؟

۲. انواع کدگذاری سقط: عمدی-عفونی-القایی-اجتناب ناپذیر؟

003-06

۳. کد عمل **orif** یا عمل گاما نیل تفاوت دارد؟

بسته به نوع شکستگی و شرایط پرونده هر **ORIF** نمی تواند گاما نیل باشد عملا گاما نیل یا **PFN** نام تجاری وسیله ایست که استفاده

می شود. یک **MULTI FUNCTIONAL NAIL**

ایمپلنت  
گاما نیل



نیل ارتوپدی سفالو مدولاری که با نام تجاری گاما در بازار ایران شناخته می شود قادر است که با قدرت و آسودگی خیال فیکسیشن شکستگی های سخت در تنه و پروگزیمال فمور را برای انجام عملی مطمئن برای بیمار و جراح فراهم کند . گاما نیل با اندکی تفاوت همان نیل فمور است که نقطه فرود آن از پیریفورمیس فوسا به تیپ گریتر تغییر پیدا کرده تا دسترسی سریع جراح به نقطه ورود آسان تر باشد



- رسول اکرم فریدونشهر
۴. کدگذاری حوادث ترافیکی و غیرترافیکی
  ۵. کدگذاری انواع مسمومیت
  ۶. کدگذاری انواع سرطان
  ۷. علایم به عنوان تشخیص
  ۸. علت مرگ و ثبت انواع علل خارجی مرگ

مدرس

۱. اسکیزوفرنیا و اسکیزوافکتیو و انواع آن:

فردی که به اسکیزوفرنی مبتلاست ممکن است دچار افسردگی یا شیدایی شود اما اسکیزوافکتیو دارای دوره های خلقی افسرده یا مانیک به عنوان تشخیص اصلیت.

SAD: schizoaffective disorder

البته تفکیک دو وضعیت دشوار است علایم اصلی روان پریشی توهم هذیان و اختلال تفکر در هر دو مورد هست.

در تشخیص SAD ویژگی های خلقی برجسته تر مورد نیاز است اما در اسکیزوفرنی اینگونه نیست. دوره های روان پریشی در اسکیزوفرنی پایدار است اما در SAD دوره های روان پریشی کوتاه تر می گردد.

۲. دوقطبی و انواع آن:

Bipolar disorder: بیماری شیدایی – افسردگی

**Bipolar I**: در صورت وجود حداقل دوره مانیا یا بدون دوره افسردگی  
**Bipolar II**: وجود حداقل یک دوره هایپومانیا و یک دوره اختلال افسردگی عمده  
اختلال خلق ادواری **cyclothymia**: دوره هایی از علایم شیدایی که از نظر شدت به آستانه نیمه شیدایی برسد همراه با دوره های افسردگی که از نظر شدت به اندازه افسردگی نباشد.  
اختلال دوقطبی با چرخه سریع **Rapid cycling in bipolar disorder**: به الگویی اطلاق می شود که در آن فرد در طی یک دوره دوازده ماهه چهار یا چند دوره مجزا ا شیدایی، هایپومانیا یا افسردگی را تجربه می کند.

۳. اعتیادها

منظریه ۲

۱. کیست هایی که نوع آن مشخص نیست و زیر واژه کیست موضع نیست چه کدی بدهیم؟  
برای کیست با موضع نامشخص از **disease** استفاده می کنیم البته توجه به نوع کیست مهم است. اگر کیست پوستی باشد در زیر کیست باید **skin** را زیرواژه ها چک کرد.
۲. برای **مسمومیت هایی که فرد** مثلاً ده بیست قرص خورده ولی دکتر نوشته خودکشی اتفاقی بزنیم یل خودکشی؟  
اگر معلوم نیست عمدی یا اتفاقی باید اتفاقی در نظر گرفت و تنها زمانی نامشخص کد می گیرد که با صراحت در پرونده درج شده باشد. اما موضوع اینجا خودکشیست.
۳. بزرگی غبغب؟

Adiposity localized E62

نوع عمل بسته به اینکه لیفت است یا لیپوساکشن یا هایفوترایی، مزوتراپی ...

۴. تشخیص لیفت پیشانی:

Surgery plastic cosmetic face lift Z41.1

۵. آبسه هایی که موضع زیر آنها وجود ندارد؟  
به خود آبسه کد دهید.
۶. موضعی که زیر آبسه یا کیست نیست و نوع آن بافت نرم یا پوستی معلوم نیست؟

سیدالشهدای سمیرم

فصل ۲-۱۹-۲۰-۲۱