




آخرین وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در کشور

تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱


معاونت بهداشت
مرکز مدیریت بیماری های واگیر

گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماریهای حاد تنفسی، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر


بر اساس داده های نظام مراقبت دیده وری تنفسی دو پاتورن (آنفلوانزا و کووید-۱۹)



در هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۴
(برابر با هفته چهل و پنجم سالجاری):



- نسبت موارد دارای علائم عفونت های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری، کاهش یافته؛ به طوری که **۹ درصد** از مراجعین **سرپایی**، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و **۷/۱ درصد** از مراجعین **بستری**، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده اند.



- در این نظام مراقبت دیده وری، از میان ۱۹۲ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد **مثبت آزمایش PCR آنفلوانزا ۴/۱ %** بوده و درصد مثبت آزمایش PCR **کووید-۱۹**، کمتر از یک درصد (صفر) بوده است.

در این هفته:

- نسبت نمونه های مثبت از نظر **آنفلوانزا**، در بیماران سرپایی، اندکی افزایش و در بیماران بستری، اندکی کاهش نشان داده است؛ لیکن هم در بیماران بستری و هم در بیماران سرپایی، از محدوده آستانه هشدار بالا، پایین تر قرار دارد.
- نسبت نمونه های تنفسی مثبت از نظر **کووید-۱۹** همچنان در سطح پایینی قرار دارد.













آخرین وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در کشور

تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

معاونت بهداشت
مرکز مدیریت بیماری های واگیر

گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماریهای حاد تنفسی، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

مقایسه تغییرات دانشگاهی درصد آنفلوانزا مثبت در آذر، دی و هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۴ (بر اساس داده های غیردیده وری آزمایشگاهی)



- نقشه های روبرو، توزیع جغرافیایی درصد مثبت شدن آنفلوانزا در میان موارد عفونت های حاد تنفسی را در آذر، دی و هفته اول بهمن ماه به تفکیک دانشگاه های علوم پزشکی نشان می دهد. (توضیح آنکه داده های مورد استفاده در ترسیم این نقشه ها از نظام مراقبت روتین/غیردیده وری استخراج شده و ممکن است دقت یافته های نظام مراقبت دیده وری را نداشته باشد).
- اگر فرض کنیم دسترسی به تست و تصمیم پزشکان برای انجام آزمایش پی سی آر آنفلوانزا در طول این مدت تغییری نکرده باشد؛ رنگ بندی این نقشه ها بیانگر شدت نسبی گردش ویروس در مناطق مختلف کشور در هفته های مورد نظر خواهند بود.
- همانگونه که در تصویر مشاهده می شود به روزرسانی هفتگی نقشه، امکان پایش روند تغییرات منطقه ای فعالیت آنفلوانزا را فراهم می کند و می تواند به عنوان ابزاری پشتیبان برای تصمیم گیری مدیریتی، هدف گذاری مداخلات بهداشتی و اطلاع رسانی مبتنی بر شواهد مورد استفاده قرار گیرد؛ با این حال، با توجه به مفروضاتی که پیش تر ذکر شد، ضرورت دارد این تغییرات هفتگی با احتیاط تفسیر شوند.
- یافته های حاصل از نظام مراقبت غیر دیده وری حاکی از آنست که در هفته اول بهمن ماه، درصد آنفلوانزای استان آذربایجان غربی حدود ۱/۷ برابر آستانه هشدار بالا، استان های آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان و گلستان برابر با آستانه هشدار بالا می باشد و همانطور که در نقشه هفته اول بهمن ماه ملاحظه می گردد بیشتر استان های کشور از موج خارج شدند.




مرکز مدیریت بیماری های واگیر
معاونت بهداشت

آخرین وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در کشور

تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماریهای حاد تنفسی، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

مقایسه روند هفتگی آنفلوانزا در کشور سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ (بر اساس نظام مراقبت غیر دیده وری آزمایشگاهی)



دانشگاه ها و مراکز همکار دیده وری



وبسایت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت icdc.behdasht.gov.ir