

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرورشی

معاونت درمان

دبيرخانه شورای راهبردی تدوین راهنمایی سلامت

شناسمه و استاندارد خدمت

کاتترینزه کردن شریان برای نمونه کیری، مونیتورینگ یا تجویز خون

پاییز ۱۴۰۰

تنظیم و تدوین:

دکتر ناهید عقدایی استاد بیهودشی فلوشیپ بیهودشی قلب، و عضو هیئت علمی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

دکتر محسن ضیائی فرد فلوشیپ بیهودشی قلب، عضو هیئت علمی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

دکتر علی دباغ استاد بیهودشی و فلوشیپ بیهودشی قلب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر بدیع الزمان رادبی متخصص بیهودشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علیرضا جلالی فراهانی استاد بیهودشی و فلوشیپ بیهودشی قلب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

دکتر علیرضا جهانگیری فرد فلوشیپ بیهودشی قلب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنمایی سلامت

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعریف سلامت

مقدمه:

کانولاسیون شریانی یک روش مناسب برای مانیتورینگ فشارخون تهاجمی و نمونه‌گیری خون جهت انجام آنالیز گازهای خون شریانی در عوامل جراحی قلب و جراحی‌های مازور و بیماران دچار شرایط بحرانی می‌باشد. کانولاسیون با تکنیک‌های مختلف شامل روش لمسی، روش سونو گرافی و روش داپلر تعییه می‌شود. می‌تواند در شریانهای مختلف رادیال، اولنار، برآکیال، اگزیالاری و تیبیالیس خلفی، دورال پدیس و فمورال تعییه کرد که شایعترین آن رادیال می‌باشد.

الف) عنوان دقیق خدمت مورد بورسی (فارسی و لاتین) به همراه کد ملی:

کاتریزه کردن یا کانوله کردن شریانی برای نمونه گیری، مانیتورینگ یا تجویز خون کد ملی: ۳۰۲۴۸۵

کاتریزه کردن یا کانوله کردن شریانی برای نمونه گیری، مانیتورینگ یا تجویز خون با کات دان، کد ملی: ۳۰۲۴۹۰

* بطور معمول جهت ارائه این خدمت از کد ۳۰۲۴۸۵ استفاده می‌شود در صورتی که کاتریزه کردن به صورت زیرجلدی انجام پذیر نباشد و به صورت جراحی محل باز می‌شود و شریان expose شده و کات را وارد می‌کنند در این حالت از کد ۳۰۲۴۹۰ استفاده می‌شود.

ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بورسی:

کاتریزاسیون شریانی یک روش مناسب و حیاتی برای مانیتورینگ فشارخون تهاجمی و نمونه گیری خون جهت انجام آنالیز گازهای خون شریانی می‌باشد که با سه روش تحت هدایت داپلر، سونو گرافی و تکنیک برپایه لمس تحت شرایط استریل انجام می‌شود.

ج) اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت ارائه خدمت:

مانیتورینگ مداوم فشار خون، حمایت داروئی و مکانیکی سیستم قلبی عروقی، نمونه گیری مکرر خون و آنالیز آن، ناتوانی در اندازه گیری فشار خون غیر مستقیم مثل چاقی مرضی و اطلاعات تشخیصی از شکل موج شریانی

• ارزیابی قبل از انجام خدمت

- توجه به کوأکلوباتی، اختلال همواراژیک بیمارانی که از داروهای ضد اعقاد یا ترموبولیتیک استفاده می‌کنند توجه به

آزمون ALLENS مثبت، عفونت موضعی، سوختگی یا مکان‌های آسیب زا،

- از اندامهای با سندرم تونل کارپیال احتساب شود، توجه به تصلب شرایان شدید و بیماری عروق محیطی بیماری رینود

- از قرارگیری در نزدیکی فیستول A-V

• ارزیابی حین انجام خدمت

قراردادن عضو کانوله در وضعیت خشی جهت جلوگیری از ایجاد عوارض ، مراقبت از خارج شدن اتفاقی کانول ، برقراری سیستم استاندارد جهت درست و صحیح خواندن فشار خون و مراقبت جهت نمونه گیری صحیح

• ارزیابی بعد از انجام خدمت

پس نمونه گیری لاین مربوطه بدقت شسته و هوا تخلیه شود یا اگر نیازی به کاتتر نیست به دقت و تحت شرایط استریل خارج گردد و به مدت چند دقیقه پانسمان فشاری شود و در صورتی که خونریزی نداشت پانسمان معمولی انجام شود.

• کنترل عوارض جانبی انجام خدمت

- عوارض احتمالی شامل ایسکمی دیستانل ، آنوریسم کاذب ، فیستول شریانی ، خونریزی ، هماتوم
- آمبولیراسیون شریانی ، غفونت موضعی ، سپسیس و نوروباتی محیطی می باشد که اگر توسط افراد مجرب و تحت شرایط مناسب انجام شود بشدت کاهش می یابد و جای نگرانی نیست

د) تواتر ارائه خدمت (تعداد دفعات مورد نیاز / فواصل انجام)

بر اساس اندیکاسیون کاتتر شریانی تعییه می شود در جراحی قلب با توجه به نوع عمل برای مونیتورینگ ممکن است نیاز به تعییه دو کاتتر باشد. برای نمونه گیری در حین عمل جراحی هر ساعت و در بیماران بخش مراقبت ویژه هر دو ساعت و در موارد دیگر با توجه به دستور پزشک و نوع بیماری ممکنه در فواصل زمانی کوتاهتر یا بلند تر انجام شود.

۵) افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) / خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:

پزشکان بخش های بستری و اورژانس با توجه به اندیکاسیون های ذکر شده می توانند تجویز نمایند

و) افراد صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:

فلوشیپ بیهوشی قلب

متخصص بیهوشی ، رزیدنت بیهوشی

فوق تخصص مراقبت های ویژه

متخصص طب اورژانس

فوق تخصص جراحی قلب

فوق تخصص داخلي قلب

فوق تخصص جراحى عروق

ز) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:

عنوان تخصص	تعداد موردنیاز به طور استاندارد به ازای ارائه هر خدمت	میزان تحصیلات موردنیاز	سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم	نقش در فرایند ارائه خدمت
کارشناس	۱	کارشناس به بالا	-	آشنا با فرآیند کار

تبصره ۵: ضروری است کارشناس در مورد نحوه کار با سیستم آرتلاین و موئیتورینگ فشار خون آموزش دیده باشد.

ح) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت:

حدائق یک اتاق به ابعاد ۳ در ۴ متری برای بستری بیمار و انجام پروسیجر مربوطه نیاز است.

ط) تجهیزات پژوهشی سرمایه ای به ازای هر خدمت:

۱- برای هر بیمار یک عدد دستگاه موئیتورینگ همودینامیک

۲- یک دستگاه آنالایر گاز های خون شریانی

ی) داروها، مواد و لوازم مصرفی پژوهشی جهت ارائه هر خدمت:

میزان مصرف (تعداد یا نسبت)	اقلام مصرفی مورد نیاز	نحوه
۱	کاغذ به همراه پرینتر	۱
از هر کدام یک عدد به ازای هر بیمار	ترانس迪وسر، لوله های اتصال، کاف برای ایجاد فشار لازم شستشو، هیارین، سه راهی، سرنگ و سرم نرمال سالین	۲

ک) استانداردهای ثبت:

انجام کاتولاسیون شریانی برای مانیتورینگ فشارخون تهاجمی و نمونه‌گیری خون جهت انجام آنالیز گازهای خون شریانی با کد ملی ۳۰۲۴۸۵ در اعمال جراحی قلب و جراحی‌های مازور و بیماران دچار شرایط بحرانی اقدامی ضروری است

- نحوه تعییه و محل کاتول گذاری بر اساس اندیکاسیون در پرونده بیمار ذکر شود

- در شیت بیمار نمودار و عدد فشار خون چارت گردد

- درمان‌های لازم با ذکر نام دارو یا هر گونه ماده تجویزی دقیقاً ذکر شود

- نام تجویز کننده و ثبت کننده ذکر گردد

- نام تجویز کننده و نمونه گیر ذکر گردد

- نام تفسیر کننده و مداخله کننده گاز‌های خون شریانی ذکر گردد

ل) اندیکاسیون‌های دقیق جهت تجویز خدمت:

برای موارد زیر اندیکاسیون دارد که کاتولاسیون شریانی برای مانیتورینگ فشارخون تهاجمی و نمونه‌گیری خون جهت انجام آنالیز گازهای خون شریانی با کد ملی ۳۰۲۴۸۵ در اعمال جراحی قلب و جراحی‌های مازور و بیماران دچار شرایط بحرانی انجام شود

- ۱- مانیتورینگ مداوم فشار خون شریانی
- ۲- حمایت داروئی و مکانیکی سیستم قلبی عروقی
- ۳- نمونه گیری مکرر خون و آنالیز آن
- ۴- نا توانی در اندازه گیری فشار خون غیر مستقیم مثل چاقی مرضی
- ۵- اطلاعات تشخیصی از شکل موج شریانی
- ۶- بیماران تحت اعمال جراحی گسترده
- ۷- بیماران ترومایی شدید

م) شواهد علمی در خصوص کنتراندیکاسیون های دقیق خدمت:

کنتراندیکاسیون مطلقی وجود ندارد ولی موارد زیر باید مد نظر باشد.

- ۱- کو اگلوباتنی، اختلال هموراژیک بیمارانی که از داروهای ضد انعقاد یا ترومبولیتیک استفاده می کنند
- ۲- عفونت موضعی، سوختگی یا مکان های آسیب زا
- ۳- از اندازه های با سندروم تونل کارپال اجتناب شود،
- ۴- توجه به تصلب شرایین شدید و بیماری عروق مجیطی بیماری رینود
- ۵- از قرارگیری در نزدیکی فیستول A-V و قرار دادن پیوند مصنوعی خودداری شود

ن) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

عنوان تخصص	میزان تحصیلات	مدت زمان مشارکت در فرایند ارائه خدمت	نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه خدمت	نمره:
پزشک متخصص و بالاتر	متخصص و بالاتر	۳۰ تا ۶۰ دقیقه برای هر کانولاسیون و ۳۰ دقیقه تا چند ساعت برای تفسیر و درمان	ارزیابی بیمار جهت خدمت ، انجام کانولاسیون و تفسیر و درمان و رفع نقص سیستم	۱
کارشناس	کارشناسی و بالاتر	نگه داری سیستم در طی مدت مونیتورینگ و نمونه گیری	آعاده کردن سیستم مونیتورینگ و نمونه گیری	۲

س) مدت اقامت در بخش های مختلف بستره جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:

با توجه به نوع عمل جراحی و وضعیت بالینی بیمار مدت اقامت جهت مونیتورینگ و نمونه گیری متفاوت می باشد. کاتتریزاسیون شریانی قبل از عمل جراحی یا در زمان پذیرش بیمار در بخش مربوطه انجام می شود. برای نمونه گیری در حین عمل جراحی هر ساعت و در بیماران بخش مراقبت ویژه هر دو ساعت و در موارد دیگر با توجه به دستور پزشک و نوع بیماری ممکنه در فواصل زمانی کوتاهتر یا بلند تر انجام شود.

ع) موارد ضروری جهت آموزش به بیمار:

اگر بیمار بیدار باشه آموزش به بیمار بصورت توضیح مختصر درباره کانولاسیون و نمونه گیری کافی است

منابع:

1. Schroeder J, Mark J, Barbeito A. Cardiovascular Monitoring.In:Miller R.Miller's Anesthesia.Philadelphia:Elsevier;2020.P.1145-1193
2. Bernd Saugel , Karim Kouz , Agnes S Meidert , Leonie Schulte-Uentrop , Stefano Romagnoli.How to measure blood pressure using an arterial catheter: a systematic 5-step approach2020 Apr 24;24(1):172. doi: 10.1186/s13054-020-02859-w.
3. Bhattacharjee S, Maitra S, Baidya DK. Comparison between ultrasound guided technique and digital palpation technique for radial artery cannulation in adult patients: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of clinical anesthesia. 2018;47:54-9.
4. Wilson C, Rose D, Kelen GD, Billioux V, Bright L. Comparison of ultrasound-guided vs traditional arterial cannulation by emergency medicine residents. Western Journal of Emergency Medicine. 2020;21(2):353.

• تاریخ اعتبار این راهنمای زمان ابلاغ به مدت ۳ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی مبایست ویرایش صورت پذیرد.

▲

توضیحات	مدت زمان ارائه	توافر خدمتی		محل ارائه خدمات	شرط تجویز		ارائه کنندگان اصلی صاحب صلاحیت	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	کاربرد خدمت	RVU کد	عنوان استاندارد
		فواصل انجام	تعداد دفعات مورد نیاز		کنترال اندیکاسیون	اندیکاسیون					
خدمت براساس مستندات پرونده بیمار محاسبه گردد	۶۰ تا ۳۰ دقیقه برای کانولاسیون یک یا هر کانولاسیون مونیتوریگ و ۳۰ دقیقه تا چند ساعت ساعت ساعت برای درمان	باشد کاتر شریانی تعییه می شود. نمونه گیری حین عمل جراحی هر ساعت در بیماران مطلق ندارد بخش مراقبت ویژه هر دو ساعت در مواردی به دستور پزشک و نوع بیماری متفاوت است	کاتر شریانی گیری حین عمل ویشن های های بسترهای اورژانس	اتاق های متعلق ندارد	مونتورینگ مداوم فشار خون . حمایت داروئی و مکانیکی سیستم قلبی عروقی، نمونه گیری مکرر خون و آنالیز آن، نا توانی در اندازه گیری فشار خون غیر مستقیم مثل چاقی مرضی و اطلاعات تشخیصی از شکل موج شریانی	فلوشیپ بیهوشی قلب متخصص بیهوشی رزیدنت بیهوشی بسترهای اورژانس فوق تخصص مراقبت های ویژه اورژانس	پزشکان بخش های بسترهای اورژانس	بسهی	۳۰۲۴۸۵ ۳۰۲۴۹۰	کاتریزه کردن شریان برای نمونه گیری مونیتوریگ یا تجویز خون	

* تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابلاغ به مدت ۳ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی مبایست ویرایش صورت پذیرد.

