



معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

فوسکانت سدیم

(FOSCARNET)

پاییز ۱۴۰۵

کمیته مشاوران جهت تنظیم ، تدوین و تایید نهایی :

دکتر مسعود ناصری پور - دبیر بورد تخصصی چشم پزشکی

دکتر ساسان نیک اقبالیان - رئیس انجمن علمی پیوند اعضا ایران

دکتر مجتبی شفیع خانی - متخصص داروسازی بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر محمد رضا صبری - دبیر بورد بیماریهای قلب کودکان

دکتر روح اله شیرزادی - دبیر بورد بیماریهای ریه کودکان

دکتر امیر هوشنگ احسانی - دبیر بورد بیماریهای پوست و مو

دکتر محکم - دبیر بورد فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)

دکتر رضا ملک زاده - دبیر بورد گوارش و کبد بالغین

دکتر مصطفی قانع - دبیر بورد بیماریهای ریه

دکتر سیداسداله موسوی - دبیر بورد فوق تخصصی خون و سرطان بالغین

دکتر حسن ابوالقاسمی - دبیر بورد فوق تخصصی ورئیس انجمن علمی خون و انکولوژی اطفال

دکتر محمد فرانوش - دبیر انجمن علمی خون و انکولوژی اطفال

دکتر عبدالله کریمی - دبیر بورد عفونی کودکان

دکتر مریم رجب نژاد - دستار فوق تخصصی عفونی کودکان

دکتر محمد هادی ایمانیه - دبیر بورد گوارش کودکان

دکتر پیام طبرسی - دبیر بورد بیماریهای عفونی

دکتر محمد رضا عباسی - دبیر بورد نفرولوژی کودکان

دکتر محمد رضا میرزا آقایان - رئیس انجمن جراحان قلب کودکان

دکتر امیر اله وردی - کارشناس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

دکتر شیما افشار - متخصص داروسازی بالینی

تحت نظر :

دکتر سید سجاد رضوی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

بسمه تعالی
راهنمای تجویز دارو

نام و شکل دارو	محل تجویز	تخصص های مجاز	موارد مصرف	دوز و تواتر مصرف
فوسکارنت سدیم 24 mg/mL در 250-500ml	مراکز مجهز بستری	<p>فوق تخصص بیماری های عفونی اطفال</p> <p>- متخصص عفونی و فلوشیپ های آن</p> <p>- فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین / اطفال</p> <p>- فوق تخصص پیوند مغز استخوان</p> <p>- فوق تخصص ریه (کودکان و بزرگسالان)</p> <p>- فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی</p> <p>- فلوشیپ پیوند سلولهای بنیادی خونساز اطفال،</p> <p>- فوق تخصص نفرولوژی، فوق تخصص گوارش</p> <p>- متخصص ارولوژی، متخصص نورولوژی</p> <p>- فلوشیپ جراحی پیوند اعضا</p> <p>- فوق تخصص قلب اطفال</p> <p>- فلوشیپ نارسایی قلب</p>	<p>بیماری تهاجمی بافتی غیر رتینیت CMV (شامل کولیت، ازوفازیت، پنومونیت و درگیری عصبی)</p>	<p>روش (IV):</p> <p>60 mg/kg هر ۸ ساعت یا 90 mg/kg هر ۱۲ ساعت به مدت حداقل ۱۴ تا ۲۱ روز (ادامه درمان بسته به وضعیت نقص ایمنی و پاسخ بالینی/ویرولوژیک متغیر است). در درگیری عصبی مصرف همزمان با گانسیکلوویر.</p> <p>اطفال (Off-label):</p> <ul style="list-style-type: none"> بیماران نقص ایمنی (شیرخواران، کودکان، نوجوانان): 180 mg/kg/day منقسم هر ۸ یا ۱۲ ساعت، حداقل به مدت ۲ هفته. درگیری گوارشی (کولیت یا ازوفازیت) در نوجوانان: 180 mg/kg/day منقسم هر ۸ یا ۱۲ ساعت به مدت ۲۱ تا ۴۲ روز یا تا زمان برطرف شدن کامل علائم. درمان نگهدارنده پس از بیماری گوارشی در اطفال: روتین نیست و فقط در صورت بروز عود بیماری توصیه می شود.

<p>۱. رتینیت CMV در بیماران دچار نقص ایمنی؛ درمان القایی و نگهدارنده، به عنوان درمان جایگزین یا خط دوم در موارد مناسب (On-label) برای بیماران واجد شرایط طبق برجسب دارو).</p> <p>۲. تزریق داخل زجاجیه فوسکارنت در رتینیت شدید یا ضایعات تهدیدکننده بینایی (Off-label).</p> <p>۳. رتینیت CMV و پیشگیری ثانویه مزمن در شیرخواران، کودکان و نوجوانان، به ویژه مبتلایان به HIV (Off-label).</p>	<p>۱. رتینیت CMV در بیماران دچار نقص ایمنی؛ درمان القایی (Induction) : 60 mg/kg هر ۸ ساعت یا 90 mg/kg هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۴ الی ۲۱ روز. - نگهدارنده (Maintenance) : 90 to 120 mg/kg یک بار در روز (شروع با ۹۰، در صورت پیشرفت تا ۱۲۰ قابل افزایش است). ۲. 4 mg در 0.1 ml هفته ای یک بار تا غیرفعال شدن ضایعه (همراه درمان وریدی).</p> <p>۳. ۱۷ : - القایی (Induction) : 180 mg/kg/day در دوزهای منقسم (هر ۸ یا ۱۲ ساعت) به مدت ۱۴ الی ۲۱ روز (در ضایعات تهدیدکننده فوری بینایی: ترکیب با تزریق داخل چشمی یا گانسیکلوویر سیستمیک) - نگهدارنده (Maintenance) : فاز نگهدارنده مزمن / پیشگیری ثانویه IV : 90 to 120 mg/kg/dose یک بار در روز (۲۴ ساعته) تا بازیافت سیستم ایمنی (Immune Reconstitution)</p>	<p>- فوق تخصص بیماری های عفونی اطفال - متخصص عفونی و فلوشیپ های آن</p> <p>- فوق تخصص خون و انکولوژی بزرگسالان و اطفال</p> <p>- فوق تخصص پیوند مغز استخوان</p> <p>- فلوشیپ شبکه و یوئیت</p>	
<p>• IV : - القایی (Induction) : 60 mg/kg هر ۸ ساعت یا 90 mg/kg هر ۱۲ ساعت (به مدت ۲ هفته و تا زمان منفی شدن بار ویروسی). - نگهدارنده (Maintenance) : پس از حداقل ۱ تا ۲ هفته درمان القایی و کاهش قابل توجه بار ویروسی، ادامه با 90 mg/kg یک بار در روز تا منفی شدن کامل ویروس.</p> <p>• IV : - القایی (Induction) : 180 mg/kg/day در دوزهای منقسم (هر ۸ یا ۱۲ ساعت) به مدت حداقل ۲ هفته و تا زمان منفی شدن بار ویروسی یا کاهش چشمگیر آن. - نگهدارنده (Maintenance) :</p>	<p>- درمان پیشگیرانه (Preemptive) در گیرندگان پیوند سلول های بنیادی خون ساز (HSCT) (Off-label): بزرگسالان</p> <p>- اطفال:</p> <p>- پروفیلاکسی اولیه CMV در گیرندگان پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوتنیک (HSCT) داروی</p>	<p>- فوق تخصص بیماری های عفونی اطفال - متخصص عفونی و فلوشیپ های آن بزرگسالان</p> <p>- فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین/اطفال - فوق تخصص پیوند مغز استخوان</p>	

<p>جایگزین / خط دوم در موارد عدم امکان استفاده از سایر گزینه‌ها، اطفال (Off-label)</p> <p>بر اساس صلاحدید مرکز و وضعیت بیمار.</p> <p>– شیرخواران، کودکان و نوجوانان 90 mg/kg/dose هر ۲۴ ساعت (یک‌بار در روز) طول دوره مصرف به‌طور معمول از زمان پیوندیافتگی مغز استخوان (Engraftment) تا روز ۱۰۰ پس از پیوند؛ مدت زمان نهایی وابسته به وضعیت ایمنی بیمار و صلاحدید مرکز پیوند متغیر است.</p>				
<p>۱۷.۱: 40 mg/kg هر ۸ تا ۱۲ ساعت (۱۴ تا ۲۱ روز یا تا زمان بهبودی).</p> <p>۲. داخل چشمی: 1.2 mg در 0.05 ml (دوبار در هفته) همراه با درمان سیستمی (نکته: به دلیل تداخلات دارویی شدید، بررسی تداخلات قبل از تجویز الزامی است).</p> <p>۳. روش وریدی (IV): (صرفاً در صورت مقاومت مستند یا بالینی به آسیکلوویر) • شیرخواران و کودکان مبتلا به HIV: دوز تام روزانه: 120 mg/kg/day به‌صورت منقسم در دوزهای هر ۸ یا ۱۲ ساعت. (طول دوره درمان بر اساس شدت بیماری، محل درگیری و پاسخ بالینی بیمار متغیر است). • نوجوانان مبتلا به HIV: 80 to 120 mg/kg/day به‌صورت منقسم در دوزهای هر ۸ یا ۱۲ ساعت تا زمان حصول پاسخ بالینی (معمولاً تا ترمیم کامل ضایعات).</p> <p>۴. IV: 120 to 180 mg/kg/day به‌صورت دوزهای منقسم هر ۸ ساعت به‌مدت ۷ تا ۱۰ روز، یا تا زمانی که به‌مدت حداقل ۴۸ ساعت هیچ ضایعه جدیدی ظاهر نشود و ضایعات قبلی رو به بهبودی بروند.</p>	<p>۱. عفونت هرپس سیمپلکس (HSV) موکوتائوس مقاوم به آسیکلوویر</p> <p>۲. نکروز پیشرونده خارجی شبکیه (PORN) ناشی از واریسلا زوستر</p> <p>۳. درمان عفونت‌های ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس (HSV) مقاوم به آسیکلوویر (اطفال)</p> <p>۴. عفونت ویروس واریسلا زوستر (VZV) مقاوم به درمان یا عدم‌پاسخ بالینی به آسیکلوویر دارای HIV (اطفال)</p>	<p>– فوق تخصص بیماری‌های عفونی اطفال</p> <p>– متخصص عفونی و فلوشیپ‌های بزرگسالان</p> <p>– فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین/اطفال</p> <p>– فوق تخصص پیوند مغز استخوان</p> <p>– فلوشیپ شبکیه و یوئیت</p> <p>متخصص بیماریهای پوست و مو</p>		

<p>۵. IV-: 180 mg/kg/day به صورت منقسم هر ۱۲ ساعت، به عنوان جزئی از رژیم ترکیبی ضد ویروسی.</p> <p>-تزریق داخل زجاجیه (Intravitreal):</p> <p>1.2 mg در حجم 0.05 ml به ازای هر دوز، تزریق دو بار در هفته داخل زجاجیه (تزریق داخل زجاجیه حتماً باید همراه و همزمان با درمان سیستمیک وریدی تجویز شود).</p>	<p>۵. نکروز پیشرونده بخش خارجی شبکیه - (PORN)</p> <p>(Zoster) ناشی از VZV در بیماران مبتلا به HIV نقص ایمنی شدید</p> <p>۶- درمان عفونت هرپس زوستر</p>			
--	---	--	--	--

توضیحات و الزامات پیوست راهنمای تجویز فوسکارنت سدیم:

۱. وضعیت مصارف Off-Label:

تجویز در اندیکاسیون‌های Off-Label مانند عفونت‌های تهاجمی بافتی CMV، پروتکل‌های پیش‌دستانه و پیشگیری اولیه در پیوند HSCT، نکروز شبکیه PORN موارد مقاوم VZV/HSV در اطفال (صرفاً به عنوان خط دوم یا داروی جایگزین (Alternative Agent) و منوط به ثبت شکست درمان، تأیید مقاومت یا عدم تحمل/سمیت شدید ناشی از گانسیکلوویر، وال گانسیکلوویر یا آسیکلوویر و با تأیید پزشک معالج فوق تخصص می‌باشد.

۲. موارد منع مصرف (Contraindications):

- حساسیت شدید و مفرط به فوسکارنت سدیم یا هر یک از اجزای فرمولاسیون.
- نارسایی شدید کلیه با کلیرانس کراتینین کمتر از 0.4 mL/min/kg (یا $\text{CrCl} < 0.4 \text{ mL/min/kg}$).
- مصرف همزمان با سایر داروهای با سمیت حاد و شدید کلیوی (مانند آمفوتریسین B، آمینو گلیکوزیدها، پلی میکسین‌ها) مگر در موارد اضطرار بالینی و با پایش فشرده.

۳. الزامات تجویز و هیدراتاسیون:

- پروتکل هیدراتاسیون اجباری (Concurrent Hydration & Pre-hydration):

• در بالغین: پیش از آغاز اولین دوز، تجویز ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ میلی لیتر سرم نرمال سالین (0.9% NaCl) یا سرم قندی ۵٪ الزامی است. همزمان با هر دوز انفوزیون بعدی نیز تجویز ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی لیتر سرم جهت القای دیورز و مهار سمیت توبولار حاد کلیوی انجام گیرد (در بیماران دارای نارسایی احتقانی قلب یا محدودیت دریافت مایعات، حجم به دقت تعدیل گردد).

• در اطفال و کودکان: هیدراتاسیون پیش از انفوزیون با حجم 10 to 20 mL/kg سرم نرمال سالین (حداکثر تا ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ میلی لیتر متناسب با وزن و سن کودک) تحت پایش دقیق مایعات ورودی-خروجی انجام شود.

سرعت و شیوه انفوزیون :

• تزریق سریع یا بولوس دارو به دلیل خطر بروز هیپوکلسمی حاد، تشنج و آریتمی قلبی مطلقاً ممنوع است. تجویز حتماً باید از طریق پمپ انفوزیون وریدی صورت پذیرد.

• دوزهای $60 \text{ mg/kg} \leq$ طی حداقل ۶۰ دقیقه و دوزهای بالاتر ($90 \text{ to } 120 \text{ mg/kg}$) طی حداقل ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه انفوزیون شوند.

رقیق سازی و دسترسی عروقی :

• عروق محیطی (Peripheral Line): غلظت نهایی فوسکارنت نباید از 12 mg/mL تجاوز نماید (محلول 24 mg/mL و بال باید به نسبت ۱ به ۱ با نرمال سالین یا دکستروز ۵٪ رقیق گردد).

• کاتتر ورید مرکزی (Central Line): محلول بدون نیاز به رقیق سازی (با همان غلظت 24 mg/mL) قابل انفوزیون است.

۴. تنظیم دوز در نارسایی ارگان ها (کلیوی / کبدی):

- نارسایی کبدی :نیازی به تعدیل دوز ندارد (دارو متابولیسم کبدی نداشته و تماماً از راه ادرار دفع می شود) .

- نارسایی کلیوی :دفع دارو تماماً کلیوی است؛ سنجش کراتینین و محاسبه کلیرانس کلیوی بر اساس وزن ایده آل بدن (mL/min/kg) قبل از شروع و حین درمان الزامی بوده و دوز و فواصل مصرف باید بر مبنای جداول استاندارد رفرنس تعدیل شود :

• در کلیرانس کمتر از 0.4 mL/min/kg مصرف دارو منع شده است.

• در بیماران تحت همودایلیز، دوز تنظیمی باید منحصرأ پس از خاتمه جلسه همودایلیز انفوزیون گردد.

۵. اقدامات پاراکلینیک و پایش ایمنی (Monitoring Parameters):

عملکرد کلیه : سنجش سریال کراتینین سرم و محاسبه CrCl در روزهای متناوب (یک‌روز در میان) در فاز القایی و حداقل یک‌بار در هفته در فاز نگهدارنده.

الکترولیت‌های سرم: اندازه‌گیری کلسیم تام و کلسیم یونیزه (Ionized Ca)، منیزیم، پتاسیم و فسفر سرم ۲ تا ۳ بار در هفته در فاز القایی و هفتگی در فاز نگهدارنده (به دلیل شلاتاسیون کاتیون‌های دو ظرفیتی و ریسک بالای تشنج و آریتمی ناشی از هیپوکلسمی و هیپومنیزیمی حاد).

هماتولوژی: بررسی پایه و دوره‌ای CBC با شمارش افتراقی سلول‌های خونی (جهت پایش آنمی، لکوپنی و گرانولوسیتوپنی).

معاینات تخصصی: در اندیکاسیون رتینیت و PORN، انجام معاینات ادواری فوندوسکوپی توسط فلوشیب شبکیه جهت ارزیابی پاسخ آناتومیک و پیشگیری از جداشدگی شبکیه الزامی است.

منابع:

- Up to date 2026
- <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/getFile.cfm?setid=90e3da4e-3b1f-428b-99ca-e4bed1c80028&type=pdf>